



Lilavati Hospital and Research Centre

More than Healthcare, Human Care

सकाळ

बाळांमध्ये 'स्पायना'चा धोका गर्भधारणेपूर्वी फॉलिक ॲसिडचे सेवन गरजेचे

भाग्यश्री भुवड : सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १३ : गर्भधारणेपूर्वी महिलेच्या शरीरात असलेली फॉलिक ॲसिडची कमतरता बाळाच्या सर्वांगीण विकासावर दुष्परिणाम करणारी ठरू शकते. सध्या भारतातील मुलांमध्ये स्पायना विफिडाची प्रकरणे वाढताना दिसत आहेत. स्पायना विफिडा हा सर्वसामान्य आजार असला, तरी याबाबत महिला आणि समाजात जागरूकता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एक हजारपैकी चार ते पाच मुलांमध्ये हा विकार आढळतो.

स्पायना विफिडा या आजारात पाठीचा मणका आणि मेरूदंड व्यवस्थित विकसित होत नाही. त्यामुळे मुलांच्या विकासात अडचणी येतात. अनेकदा मुलांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने याचे वेळीच निदान व उपचार होत नाहीत. त्यामुळे भविष्यातील गुंतागुंत वाढते. स्पायना विफिडाच्या वाढत्या प्रकरणांचे गंभीरपणे लक्षात घेता लीलावती रुग्णालयाच्या बालरोग शस्त्रक्रिया विभागाने स्पायना विफिडा फाऊंडेशनच्या सहकार्याने गेल्या वर्षभरात जवळपास २० शस्त्रक्रिया मोफत आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांना परवडणाऱ्या दरात केल्या आहेत. शिवाय ३० जानेवारीला रुग्णालयात याचसाठी मोफत शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.



आजारामुळे होणारे तोटे

स्पायना विफिडा हा जन्मजात आजार आहे; पण या आजाराबाबतच्या अज्ञानामुळे ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मुलांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत. हा अनुवांशिक आजार नसून गर्भधारणेच्या सुरुवातीला आईमध्ये फॉलिक ॲसिडच्या कमतरतेमुळे मुलांमध्ये ही समस्या उद्भवते. यामुळे बाळाला कायमचे अपंगत्व, विकृती, दैनंदिन कामासाठी इतरांवर अवलंबून राहणे, लघवी आणि शौचावर नियंत्रण राहत नाही.

काय आहेत लक्षणे?

स्पिना विफिडा हा आजार पाठीच्या कण्याला प्रभावित करतो. जन्माच्या वेळी या स्थितीचे निदान होते. हा एक प्रकारचा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आहे. गर्भधारणेदरम्यान किंवा बाळाच्या जन्मानंतर निदान केले जाऊ शकते. अशक्तपणा, पायाचा अर्धांगवायू, आकडी येणे, पायांमधील विकृती आणि मूत्राशयाच्या समस्या असतात.

स्पायना विफिडा आजारामुळे बालपणातच पक्षाघात (पोलिओपेक्षा गंभीर) होतो. भारतात दरवर्षी हजार बालकांपैकी स्पायना विफिडाची चार ते पाच प्रकरणे आढळतात. फॉलिक ॲसिड सप्लिमेंट्स घेण्याबाबत जनजागृतीचा अभाव हा या स्थितीला कारणीभूत ठरणारा एक प्रमुख घटक आहे.

- डॉ. संतोष करमकर, बालरोग सर्जन

स्पायना विफिडासाठी योग्य उपचार व वैद्यकीय सेवा प्रदान करण्यासाठी लीलावती रुग्णालय हे एकमेव केंद्र आहे. रुग्णालय आणि त्याच्या बालरोग शस्त्रक्रिया विभागाने आतापर्यंत शेकडो स्पायना विफिडा रुग्णांचे यशस्वी उपचार केले आहेत.

- लेफ्ट. जन. डॉ. व्ही. रविशंकर, हृदयरोग शल्यचिकित्सक, लीलावती रुग्णालय

आजाराचे दोन प्रकार

१. मायलोमेनिंगोसेल हा स्पायना विफिडाचा सर्वात गंभीर प्रकार आहे. यात मुलांच्या पाठीच्या मणक्यावरील छिद्राच्या बाहेर एक पिशवी समाविष्ट आहे. या बैलीमध्ये पाठीचा कणा आणि मज्जातंतूंचे काही भाग असतात. बैलीतील पाठीचा कणा आणि नसा खराब होतात.

२. स्पाइना विफिडा ऑकल्टा हा स्पायना विफिडाचा सर्वात सौम्य प्रकार आहे. सहसा मुलांच्या पाठीला छिद्र नसते, फक्त मणक्यात एक अंतर असते. पाठीचा कणा किंवा मज्जातंतूंना नुकसान होत नाही. पुष्कळ वेळा, ऑकल्टाचे निदान लहानपणी किंवा प्रौढावस्थेपर्यंत होत नाही.